

Nota Técnica 546638

Data de conclusão: 29/07/2026 16:50:13

Paciente

Nome: [REDACTED]

Data de Nascimento: 07/08/1944

Idade: 81 anos

Sexo: Feminino

Cidade: Santo André/SP

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Número do Processo: 5001478-92.2026.4.03.6703

Esfera/Órgão: Justiça Federal

Vara/Serventia: 6º Núcleo de Justiça 4.0

Tecnologia 546638

CID: E85.8 - Outras amiloidoses

Diagnóstico: amiloidose por transtirretina selvagem

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): Laudo médico.

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: TAFAMIDIS

Via de administração: VO

Posologia: tafamidis 61 mg. Tomar 1 cápsula, uma vez ao dia.

Uso contínuo? -

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Sim

O medicamento está inserido no SUS? Sim

O medicamento está incluído em: RENAME

Oncológico? Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: TAFAMIDIS

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Para o tratamento da insuficiência cardíaca estão disponíveis diversos medicamentos, não direcionados especificamente para a amiloidose. Além disso, o tafamidis 61 mg constitui tratamento específico incorporado e disponível no SUS, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para pacientes que atendam aos critérios estabelecidos no PCDT (2,5).

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não

Custo da Tecnologia

Tecnologia: TAFAMIDIS

Laboratório: -

Marca Comercial: -

Apresentação: -

Preço de Fábrica: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal

Tecnologia: TAFAMIDIS

Dose Diária Recomendada: -

Preço Máximo de Venda ao Governo: -

Preço Máximo ao Consumidor: -

Fonte do custo da tecnologia: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: TAFAMIDIS

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O tafamidis é um estabilizador seletivo de transtirretina. Esse medicamento se liga aos dois sítios de ligação da tiroxina na forma tetrâmera nativa de TTR, o que previne a dissociação em monômeros, que é a etapa limitante da velocidade no processo amiloidogênico (6).

A avaliação da eficácia do tafamidis meglumina foi realizada em pacientes entre 18 e 90 anos com cardiomiopatia amiloide associada à TTR em um ensaio clínico fase (ECR) 3, randomizado, duplo-cego, comparado com placebo. Foram randomizados 441 pacientes para receberem 80 mg/dia de tafamidis meglumina, 20 mg/dia do medicamento ou placebo uma vez ao dia, na proporção de 2:1:2, por 30 meses. Os desfechos primários avaliados foram mortalidade por todas as causas e frequência de hospitalizações relacionadas a doenças cardiovasculares. O desenho do estudo e a análise estatística foram realizadas pelo patrocinador do estudo, que se trata do fabricante do medicamento. Após o período analisado, a mortalidade por todas as causas foi menor no pool de pessoas que utilizaram tafamidis meglumina (unificação dos grupos que usaram o tafamidis na dose de 20 mg e 80 mg) do que no grupo placebo (OR 0,70; IC95% 0,51 a 0,96). A taxa de hospitalizações relacionadas a doenças cardiovasculares também foi menor no grupo que recebeu tafamidis (OR 0,68; IC95% 0,56 a 0,81). Os perfis de segurança de tafamidis e placebo foram semelhantes. Em geral, os efeitos adversos reportados durante o tratamento foram leves a moderados, sendo que a descontinuação do tratamento devido aos efeitos adversos foi menos comum no grupo tratado com tafamidis meglumina do que no grupo que recebeu placebo. Não foi realizada análise de subgrupo que comparasse o grupo que utilizou 20 mg de tafamidis do grupo que utilizou 80 mg (7).

Posteriormente, houve publicação que avaliou especificamente a qualidade de vida dos pacientes que participaram no estudo anterior, a partir de quatro instrumentos de medida, o KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Overall Summary), o EQ-5D-3L (three-level Euroqol 5 Dimensions), o EQ VAS (EQ visual analog scale) e o PGA (patient global assessment). O KCCQ é um questionário preenchido pelo paciente com 23 itens que avalia a capacidade dos pacientes de realizar atividades de vida diária, frequência, gravidade e impacto dos sintomas. O EQ-5D-3L é um instrumento que avalia o estado de saúde do indivíduo, em cinco dimensões a partir de três níveis. O EQ VAS trata-se de uma avaliação a partir de uma escala visual analógica da qualidade de vida, enquanto que o PGA avalia a percepção do

paciente em relação à sua insuficiência cardíaca. Os pacientes foram avaliados nos tempos 6, 12, 18, 24 e 30 meses (ou no momento da descontinuação). Houve redução da carga da doença em todos os domínios do KCCQ no grupo que utilizou o tafamidis (OR 12,41; IC95% 8,58 a 16,24). Tais achados também foram semelhantes nos demais instrumentos de avaliação da qualidade de vida. Houve maior redução no declínio da carga da doença nos meses 18 a 30 de seguimento, a depender do questionário empregado. Na avaliação global da doença (PGA) realizada no mês 30, 42,3% dos pacientes que utilizaram tafamidis relataram melhora em comparação ao início do estudo, enquanto no grupo placebo foi de 23,8%. Na análise de subgrupo ao comparar as diferentes doses com o placebo, foi encontrado um pequeno benefício na redução da hospitalização por problemas cardiovasculares e uma pequena redução na mortalidade (valor limítrofe ao não benefício) no grupo que utilizou a dose de 80 mg, enquanto que no grupo que recebeu 20 mg, também houve redução na hospitalização mas não na mortalidade por todas as causas. O estudo não comparou diretamente os subgrupos que utilizaram 20 mg ou 80 mg de tafamidis (8).

Na submissão do relatório atual da CONITEC (5), eficácia e segurança do tafamidis no tratamento da cardiomiopatia amiloide associada à TTR foram avaliadas a partir de ECR de fase 3, controlado por placebo. O grupo de pacientes tratado com o medicamento (tafamidis meglumina 20 mg/dia ou 80 mg/dia) mostrou superioridade na redução da mortalidade por todas as causas e hospitalizações por causas cardiovasculares ao longo de 30 meses de acompanhamento em relação ao grupo placebo. Também foi observada redução do número de hospitalizações em pacientes com classe funcional NYHA I ou II e redução do declínio da capacidade funcional e da qualidade de vida no mês 30, com diferenças observadas logo no mês seis, quando comparado com placebo. O perfil de segurança do tafamidis meglumina foi semelhante ao placebo, com menor taxa de descontinuação. Embora o risco de viés para a qualidade de vida ter sido considerado alto, por tratar-se de autorrelato dos pacientes, com certeza moderada da evidência, para os desfechos mortalidade por todas as causas e hospitalização por causas cardiovasculares, os riscos de viés foram considerados baixos, com certeza moderada a alta na evidência produzida pelo ECR, respectivamente.

Em estudo clínico de fase 1, aberto e randomizado do tipo cruzado (crossover), demonstrou que o tafamidis de ácido livre (61 mg/dia, em cápsulas) e o tafamidis meglumina (80 mg/dia, 4 x 20 mg, em cápsulas) são bioequivalentes em um modelo de estado de equilíbrio estável (steady-state), após sete dias de dosagem oral repetida em jejum em 30 voluntários saudáveis. Os dois regimes apresentaram perfil de segurança e tolerabilidade aceitável, sendo uma opção de dose mais conveniente para o paciente, trazendo comodidade posológica (9). Com base nos dados desse estudo, o tafamidis ácido livre foi registrado nas agências regulatórias internacionais e na ANVISA por meio de comparação da bioequivalência com tafamidis meglumina 80 mg/dia (5).

Em um estudo de fase 3, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, com extensão de longo prazo (LTE), avaliou-se a eficácia do tafamidis em pacientes com cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM), estratificados conforme a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) basal (<50% ou ≥50%). Os pacientes foram randomizados para receber tafamidis ou placebo por 30 meses; após essa fase, puderam ingressar no estudo de extensão, no qual passaram a receber tafamidis. A análise de longo prazo comparou pacientes em tratamento contínuo com tafamidis (80 mg de meglumina ou 61 mg de ácido livre) versus tratamento tardio (placebo no ATTR-ACT seguido de tafamidis na extensão). O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas, definida como óbito, transplante cardíaco ou

implantação de dispositivo de assistência mecânica. Pacientes com FEVE <50% apresentavam maior gravidade clínica basal, maior proporção de indivíduos negros e maior frequência de ATTR-CM variante. Ao final do seguimento (mediana de 60–64 meses), embora a mortalidade absoluta tenha sido numericamente maior no grupo com FEVE <50%, o tratamento contínuo com tafamidis esteve associado a redução de 47% no risco de mortalidade em comparação ao tratamento tardio, tanto em pacientes com FEVE <50% (hazard ratio [HR] 0,53; IC95% 0,36–0,75; $p<0,001$) quanto naqueles com FEVE $\geq 50\%$ (HR 0,53; IC95% 0,344–0,818; $p<0,01$). Na discussão, os autores concluem que o tafamidis confere benefício consistente de sobrevida independentemente da FEVE basal, reforçando que a manutenção precoce e contínua do tratamento está associada a melhores desfechos clínicos, inclusive em pacientes com comprometimento sistólico mais avançado (10).

Custo:

Item: TAFAMIDIS

Descrição: 61 MG CAP MOLE CT BL AL AL X 30

Quantidade: 13

Valor unitário: R\$ 48.450,94

Valor total: R\$ 629.862,22

* Valor unitário considerado a partir de consulta de preço da tabela CMED. Preço máximo de venda ao governo (PMVG) em São Paulo (ICMS 18%). O PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF, $PMVG = PF \cdot (1 - CAP)$. O CAP, regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado nº 15, de 31 de agosto de 2017 - Versão Consolidada ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado CMED nº 5, de 21 de dezembro de 2020, o CAP é de 21,53%. Alguns medicamentos possuem isenção de ICMS para aquisição por órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal, conforme Convênio ICMS nº 87/02, sendo aplicado o benefício quando cabível.

Com base nos valores de preço máximo de venda ao governo obtidos em consulta realizada em julho de 2026 à tabela CMED no site da ANVISA, e considerando os dados da prescrição, elaborou-se a tabela acima, estimando o custo de um ano de tratamento para tafamidis 61 mg ao dia.

Relatórios anteriores da CONITEC (4,11), que analisaram a demanda do tafamidis meglumina 20 mg (dose de 80 mg/dia) para pacientes com cardiomiopatia amiloide associada à TTR, foram desfavoráveis à incorporação do medicamento no SUS, sendo uma das razões o preço elevado apresentado pelo demandante. De forma que a tecnologia apresentou perfil de custo efetividade acima do limiar considerado adequado para o contexto nacional. Em relatório da CONITEC (5), sobre a demanda do tafamidis 61 mg, para a avaliação econômica, foi realizado um estudo de custo-utilidade, na perspectiva do SUS, com horizonte temporal de 5 anos, empregando-se um modelo de Markov para acompanhar os pacientes com cardiomiopatia amiloide associada à TTR nas classes funcionais NYHA II ou III, considerando-se a transição por diferentes estados de saúde. Os resultados da avaliação econômica referente à incorporação do tafamidis 61 mg no SUS indicaram que o medicamento é capaz de proporcionar benefícios, porém, com custos adicionais que resultarão em um incremento de R\$ 173,1 mil por ano vivido e R\$ 218,8 mil por ano vivido com qualidade. O impacto orçamentário, a partir da estimativa da população elegível para o uso de tafamidis 61 mg, foi de R\$ 16,3

milhões no primeiro ano após incorporação do medicamento no SUS, com um impacto acumulado de R\$ 496,8 milhões em cinco anos. Sendo considerados altos em comparação ao cuidado padrão, inicialmente. Após consulta pública, o demandante apresentou nova proposta de redução do preço para R\$ 218,59/cápsula, com um custo mensal de R\$ 6.557,70 por paciente (considerando uma cápsula de 61 mg por dia/30 dias), representando um desconto de cerca de 80% em relação ao PMVG sem impostos. Fato que reduziu em 44,38% a razão de custo utilidade incremental (RCUI) e em 40,86% o impacto orçamentário incremental, que ficou em R\$ 293.758.609,50 no acumulado de 5 anos. Desse modo, a nova RCUI (R\$ 121.659,66/QALY) ficou próxima ao limiar de custo efetividade estabelecido pela CONITEC para casos especiais (R\$ 120.000,00/QALY). Ademais, é fundamental esclarecer que a modalidade de aquisição do tafamidis deve ocorrer de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, via importação direta, sem impostos. Todavia, se alguma aquisição ocorrer por meio do demandante, devem ser aplicados os respectivos impostos sobre os preços.

Em busca realizada ao Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), no dia 28 de julho de 2026, identifica-se contratação do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SEMS) e Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CGCEAF/SECTICS), com a Pfizer Brasil Ltda, por inexigibilidade de licitação (nº 695/2025, contrato nº 340/2025, processo SEI 25000.055096/2025-31) para o fornecimento de 38.310 cápsulas de Tafamidis 61 mg, ao custo unitário de R\$ 299,25, destinado ao abastecimento centralizado do SUS. Consta ainda, o termo Aditivo nº 00001/2026, com início de vigência em 23/07/2026, que promove acréscimo quantitativo, consistente em 9.570 cápsulas do medicamento tafamidis 61 mg, o que equivale a aproximadamente 25% do valor inicial atualizado do contrato.(12).

Quanto a avaliações internacionais, é digno de nota que o National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE) do Reino Unido, em relatório anterior, não recomendou a utilização do tafamidis para o tratamento da amiloidose transtirretina de tipo selvagem ou hereditária com cardiomiopatia em adultos, visto a ausência de medida objetiva para avaliar quais pacientes seriam elegíveis ao tratamento com tafamidis; e o fato da faixa da razão de custo incremental estar acima do que o NICE considera aceitável para a utilização dos recursos. Em novo relatório, considerando o fornecimento pela empresa mediante acordo comercial, a estimativa de custo-efetividade mais provável para a tecnologia ficou dentro da faixa aceitável pelo NICE, houve, assim, recomendação de uso do tafamidis 61 mg. Além disso, o comitê concluiu que a evidência clínica apresentada nesta avaliação foi adequada para a tomada de decisão (13).

A agência Canada's Drug Agency recomendou o reembolso de tafamidis meglumina no tratamento de pacientes adultos com cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina, apenas no caso de cumprimento de todas as seguintes condições: Doença cardíaca documentada devido a cardiomiopatia de amiloidose mediada por TTR; pacientes que possuam todas as seguintes características: classe I a III da New York Heart Association (NYHA); história de insuficiência cardíaca, definida como pelo menos uma hospitalização anterior por insuficiência cardíaca ou evidência clínica de insuficiência cardíaca que exigiu tratamento com um diurético; não recebeu um transplante de coração ou fígado; não tem um dispositivo de assistência mecânica cardíaca implantado (CMAD) e; não recebeu outros tratamentos modificadores da doença para ATTR; o tratamento deve ser descontinuado nos casos que o paciente possua evolução para classe IV da NYHA ou recebeu um transplante de coração ou fígado ou houve implantação do CMAD; ocorra a redução do preço do medicamento (14).

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Redução da mortalidade, diminuição da frequência de hospitalização e melhora na qualidade de vida em comparação com o placebo; bioequivalência entre a dose de 80 mg e 61 mg.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada

Conclusão

Tecnologia: TAFAMIDIS

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Há evidência de benefício a do tafamidis para o tratamento da cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina (ATTR-CM), demonstrando redução da mortalidade por todas as causas e da taxa de hospitalizações por causas cardiovasculares em comparação ao placebo. Após significativa redução do preço proposto, a CONITEC emitiu parecer favorável à incorporação do tafamidis 61 mg para essa condição clínica (6) e foi efetivamente incorporado em 2026.

Primeiramente, sugere-se a obtenção de manifestação do CEAF quanto ao andamento e ao desfecho do processo administrativo, uma vez que não consta nos autos informação sobre eventual deferimento ou indeferimento do pedido. Trata-se de tecnologia recentemente incorporada no SUS. Conforme decreto nº 7.508/2011, o SUS tem 180 dias após publicação da portaria de incorporação para dar início à sua oferta na rede pública.

No caso em análise, considerando os critérios do parecer favorável à incorporação do tafamidis 61 mg no SUS, observa-se que o laudo médico descreve que a paciente apresenta classe funcional NYHA I-II, enquanto a recomendação contempla pacientes com classe funcional NYHA II ou III. Entretanto, depreende-se da descrição da sintomatologia que a paciente se encaixe nos critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), considerando a presença de sintomas como fadiga aos esforços.

Dessa forma, considerando que o medicamento pleiteado encontra-se atualmente disponibilizado no âmbito do SUS e que a parte autora poderá ter acesso ao tratamento caso preencha os critérios de elegibilidade previstos no PCDT, entende-se que o fornecimento deve ocorrer, preferencialmente, pela via administrativa, mediante solicitação ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Assim, no presente momento, com ausência da negativa administrativa, não se verifica justificativa para o fornecimento judicial da tecnologia. Mantém-se, por ora, a conclusão desfavorável à concessão judicial do pleito, sem prejuízo de reavaliação do caso, caso haja deferimento do pedido administrativo sem o correspondente fornecimento do medicamento.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas:

1. Gorevic PD. Overview of amyloidosis [Internet]. Waltham (MA): UpToDate. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas das Amiloidoses associadas à transtirretina. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/a/amiloidoses-associadas-a-transtirretina.pdf/view>
3. Fontana M. Cardiac amyloidosis: Clinical manifestations and diagnosis. Waltham (MA): UpToDate. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/cardiac-amyloidosis-clinical-manifestations-and-diagnosis>
4. CONITEC. Relatório de recomendação nº 600. Tafamidis meglumina no tratamento de pacientes com cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária) acima de 60 anos de idade. Mar 2021. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210319_relatorio_600_tafamidis-meglumina_cm-ttr.pdf
5. CONITEC. Relatório de recomendação nº 899. Tafamidis 61 mg no tratamento de pacientes com cardiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária), classe NYHA II e III acima de 60 anos de idade. Mai 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/tafamidis-61-mg-no-tratamento-de-pacientes-com-cardiopatia-amiloide-associada-a-transtirretina-selvagem-ou-hereditaria-classe-nyha-ii-e-ii-acima-de-60-anos-de-idade>
6. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. Vindaquel® (tafamidis meglumina)[Bula]. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Vyndaquel>
7. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018 Sep 13;379(11):1007-1016.
8. Hanna M, Damy T, Grogan M et al. Impact of Tafamidis on Health-Related Quality of Life in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy (from the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial). Am J Cardiol. 2021 Feb 15;141:98-105.
9. Lockwood PA, Le VH, O’Gorman MT, Patterson TA, Sultan MB, Tankisheva E, et al. The Bioequivalence of Tafamidis 61-mg Free Acid Capsules and Tafamidis Meglumine 4 × 20-mg Capsules in Healthy Volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. outubro de 2020;9(7):849–54.
10. Maurer MS, Elliott P, Merlini G, Shah SJ, Cruz M, Rapezzi C, et al. Long-term tafamidis efficacy in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy by baseline left ventricular ejection fraction: results from the ATTR-ACT trial and long-term extension study. Eur J Heart Fail. 2024. doi:10.1002/ehf.3330. PMID:38932583.
11. CONITEC. Relatório de recomendação nº 795. Tafamidis meglumina no tratamento de pacientes com cardiomiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária), classes NYHA II e III acima de 60 anos de idade. Dezembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/20221222_relatorio_tecnico_tafamidis_795_2022.pdf

12. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Edital 00394544000185/2025/2820. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/editais/00394544000185/2025/2820>. Acesso em: 28 jul. 2026.
13. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Tafamidis for treating transthyretin amyloidosis with cardiomyopathy. Technology appraisal guidance. Reference number: TA984. Published: 19 June 2024. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ta984/resources/tafamidis-for-treating-transthyretin-amyloidosis-with-cardiomyopathy-pdf-82615910400709>
14. Canadian Agency for Drugs & Technologies in Health (CADTH). CADTH COMMON DRUG REVIEW CADTH Canadian Drug Expert Committee Recommendation (Final). Tafamidis Meglumine (Vyndaquel – Pfizer Canada ULC). Disponível em: <https://www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0625%20Vyndaquel%20-%20CDEC%20Final%20%20Recommendation%20February%2020%2C%202020%20for%20posting.pdf>

NatJus Responsável: Nacional

Instituição Responsável: NAT-Jus Doenças Raras - HCPA/TelessaúdeRS

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: Conforme laudo médico, datado de 14/07/2026 (Num. 594635143), trata-se de paciente com diagnóstico confirmado de amiloidose por transtirretina selvagem sustentado por cintilografia positiva (Perugini II), exclusão laboratorial de amiloidose AL e manifestações extracardíacas típicas da doença. Encontra-se em seguimento cardiológico há vários anos por doença cardiovascular estrutural complexa, inicialmente em decorrência da progressão de estenose aórtica degenerativa, tratada com sucesso por implante transcater de prótese valvar aórtica (TAVI) em abril de 2022. Após o procedimento, manteve evolução clínica relativamente satisfatória, porém persistindo com fadiga aos esforços, limitação funcional leve (descrita como classe funcional NYHA I-II), além do aparecimento progressivo de manifestações extracardíacas altamente sugestivas de amiloidose por transtirretina. Durante a investigação etiológica foram identificadas alterações compatíveis com depósito sistêmico de transtirretina, culminando no diagnóstico de amiloidose ATTR selvagem. A paciente apresenta síndrome do túnel do carpo bilateral grau IV documentada por eletroneuromiografia, manifestação reconhecida como um dos principais marcadores clínicos precoces da ATTR, frequentemente precedendo em vários anos o desenvolvimento da cardiomiopatia infiltrativa. Além disso, a investigação demonstrou captação grau II na cintilografia óssea com pirofosfato, exame atualmente considerado específico para ATTR na ausência de gamopatia monoclonal. A investigação hematológica foi negativa para amiloidose AL, incluindo ausência de componente monoclonal e cadeias leves livres sem evidência de doença plasmocitária, confirmando o diagnóstico de ATTR não-AL. Consta ainda, que embora a ressonância magnética cardíaca não demonstre critérios clássicos de cardiomiopatia amiloidótica avançada, diversos achados sustentam acometimento cardíaco inicial pela doença. Entre eles destacam-se: NT-proBNP de 1.400 pg/mL; espessamento discreto do septo ventricular (13 mm); manutenção de sintomas compatíveis com insuficiência cardíaca inicial; histórico de estenose aórtica degenerativa, condição fortemente associada à ATTR selvagem e cintilografia positiva

para depósito de transtirretina. Foi anexado aos autos exame de amiloidose familiar (sequenciamento do gene TTR) com ausência de variantes nos genes listados que isoladamente justifiquem quadro clínico (Num. 590532746 - Pág. 6). Laudo fisioterapêutico, datado de 11/06/2026, relata que a paciente apresenta quadro álgico em ombro esquerdo e direito, limitação articular, déficit de força muscular e funcional bilateralmente, lombar com dor e rigidez. Está fazendo uso de ultrassom, Tens, laser, cinesioterapia, visando melhora da dor, aumento da ADM, ganho de força muscular e função. Vem evoluindo gradativamente, com melhora da amplitude e força muscular e coluna lombar com redução do quadro álgico, porém necessita dar continuidade ao tratamento de reabilitação até restaurar a função completa (Num. 594638079 - Pág. 2). Consta prescrição médica indicando o uso de levotiroxina sódica 88 mcg (1 comprimido ao dia), colecalciferol 2.000 UI (1 comprimido ao dia), associação de cloridrato de tiamina 100 mg, cloridrato de piridoxina 100 mg e cianocobalamina 5.000 mcg (1 vez por semana), associação de ácido acetilsalicílico 100 mg, carbonato de magnésio 30 mg e glicinato de alumínio 15 mg (1 comprimido ao dia), dapagliflozina 10 mg (1 comprimido ao dia), metformina 500 mg (2 comprimidos ao dia), associação de rosuvastatina cálcica 20 mg e ezetimiba 10 mg (1 comprimido ao dia), hemifumarato de bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido ao dia), denosumabe 60 mg/mL (1 ampola a cada seis meses), betaistina 24 mg (2 comprimidos ao dia por 30 dias), Bariatric Fusion® (2 cápsulas ao dia) e tafamidis 61 mg (1 comprimido ao dia) (Num. 594635136).

Foi anexado laudo de solicitação do medicamento tafamidis 61 mg junto ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), assinado em 06/04/2026 (Num. 590532746 - Pág. 4).

Consta na petição inicial que, em fevereiro de 2026, foram iniciadas as buscas por orientação para o tratamento. Em 09/04/2026, foi protocolado o Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME) no Hospital Mário Covas. Posteriormente, em 27/05/2026, foi encaminhada notificação extrajudicial à Secretaria e, diante da manutenção da inércia administrativa, em 25/06/2026 foi ajuizada a presente ação (Num. 590532713 - Pág. 6). Nesse contexto, pleiteia o fornecimento de tafamidis 61 mg.

Amiloidose é o termo geral usado para se referir à deposição de tecido extracelular de fibrilas compostas por subunidades de baixo peso molecular de uma variedade de proteínas, muitas das quais circulam como constituintes do plasma. Esses depósitos podem resultar em uma ampla gama de manifestações clínicas, dependendo do tipo, localização e quantidade de deposição (1). Existem diferentes tipos de amiloidoses, entre elas as amiloidoses hereditárias ligadas a proteínas precursoras que sofreram mutação, tais como a transtirretina (TTR). Mutações ligadas à amiloidose do gene da TTR têm herança autossômica dominante. As diferentes mutações geram diferentes idades de início e diferentes apresentações clínicas, permitindo para a maioria das mutações já descritas uma boa correlação genótipo-fenótipo (2).

As amiloidoses por TTR manifestam-se por meio de dois quadros clínicos principais: a polineuropatia amiloidótica familiar (PAF-TTR) e a cardiomiopatia amiloidótica familiar (CAF-TTR). No caso do CAF-TTR, ocorre deposição de fibrilas amiloides no espaço extracelular do coração, causando alterações na condução cardíaca de forma precoce, bloqueios de condução e arritmias, necessidade de implante de marca-passo, e mais tardiamente cardiopatia e disfunção por infiltração miocárdica de amiloide (2,3). A cardiomiopatia amiloide associada à TTR, pode se manifestar como dois genótipos: hereditária ou selvagem (adquirida ou senil). Nos dois casos, a proteína amiloide pode infiltrar qualquer uma ou todas as estruturas

cardiovasculares, incluindo o sistema de condução, o miocárdio atrial e ventricular, tecido valvar e as artérias e coronárias. Os sintomas geralmente incluem insuficiência cardíaca, dispneia ao esforço, retenção de líquidos e hipotensão (4).